

多维铁口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称: 多维铁口服溶液
英文名称: Multivitamin Iron Oral Solution
汉语拼音: Duoweitie Koufufurongye

【成份】

本品为复方制剂, 每毫升含维生素E0.1毫克, 维生素B₂0.05毫克, 维生素B₁0.05毫克, 维生素B₆0.05毫克, 烟酸0.25毫克, 叶酸0.01毫克, 硫酸锌0.2毫克, 盐酸赖氨酸50毫克, 甘油磷酸铁5毫克。辅料为: 蔗糖、枸橼酸、食用香精、食用色素、苯甲酸钠。

【性状】

本品为红棕色黏稠液体。

【作用类别】

本品为维生素与矿物质类非处方药药品。

【适应症】

用于防治因维生素、铁、锌、叶酸及赖氨酸缺乏引起的各种疾病。

【规格】

复方

【用法用量】

口服。成人, 一次10~15毫升; 婴儿, 一次2~4毫升; 2~7岁小儿, 一次5~7毫升; 7岁以上儿童, 一次7~10毫升; 均为一日2次, 饭后服。

【不良反应】

1. 可见胃肠道反应, 如恶心、呕吐、上腹部疼痛及便秘。
2. 可致便秘和黑便。
3. 长期过量服用可引起草酸盐或尿酸盐结石。

【禁忌】

1. 含铁血黄素沉着症、血色病及非缺铁的其他贫血患者禁用。
2. 严重肝肾功能不全者禁用。
3. 急性或活动性消化溃疡者禁用。

【注意事项】

1. 不应与浓茶同服。
2. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
3. 本品性状发生改变时禁止使用。
4. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
5. 儿童必须在成人监护下服用。
6. 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品不宜与磺胺类药物合用。
2. 本品与磷酸盐类、四环素类及鞣酸等同服, 可减少铁的吸收。
3. 本品可减少左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴及喹诺酮类药物的吸收。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用, 详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品所含多种维生素是维持人体正常生理功能的一类营养素, 它参与人体的糖、蛋白质、脂肪的代谢, 维持各生理系统的正常功能, 抵抗感染, 保持健康。所含铁元素是血红蛋白的主要组成成份; 锌则是体内多种酶的重要组成成份, 具有促进生长发育, 改善味觉等作用。赖氨酸亦具有促进人体生长发育的作用。

【贮藏】

遮光, 密封, 在阴凉处保存(不超过20℃)。

【包装】

1. 棕色玻璃瓶装, 每支装10毫升, 每小盒装10支。
2. 棕色玻璃瓶装, 每支装10毫升, 每小盒装12支。
3. 棕色玻璃瓶装, 每支装10毫升, 每小盒装16支。
4. 棕色玻璃瓶装, 每支装10毫升, 每小盒装24支。

【有效期】

暂定24个月

【执行标准】

国家食品药品监督管理局国家药品标准(修订) WS-10001-(HD-0523)-2002-2007

【批准文号】

国药准字H33021823

【说明书修订日期】

2016年03月07日

【生产企业】

企业名称: 宁波立华制药有限公司
生产地址: 宁波市高桥工业园区
邮政编码: 315174
电话号码: 0574-88046999
传真号码: 0574-88046000
网 址: <http://www.nbliwah.com>

如有问题可与生产企业联系

宁波立华制药有限公司